

Sífilis

Hazte la prueba en The DOCK

Las pruebas de clamidia, gonorrea o sífilis tienen un valor de solo USD 25. Esto incluye el análisis y el tratamiento inicial. Las pruebas de VIH y Hepatitis C son GRATIS.

Cuándo hay que realizar la prueba de la sífilis

Solo las pruebas de laboratorio pueden confirmar que una persona está infectada con sífilis. Se recomienda realizar pruebas complementarias con un profesional médico para asegurar que el tratamiento haya sido efectivo.

Cómo se realizan las pruebas de sífilis

Generalmente, se realiza un análisis de sangre para determinar si la persona tiene sífilis. Algunos profesionales médicos solicitan un análisis del líquido de una úlcera de sífilis para diagnosticar la enfermedad.

THE DOCK
Powered by Desert AIDS Project

1695 N. Sunrise Way (en Vista Chino)
Palm Springs, CA 92262

(760)-992-0492

Se Habla Español



Hazte la prueba
en The DOCK

THE DOCK
Powered by Desert AIDS Project

¿Cómo se transmite la sífilis?

La sífilis se puede contagiar mediante contacto directo a través de una úlcera por sífilis durante una práctica sexual vaginal, anal u oral. Las úlceras pueden encontrarse en el pene, la vagina, el ano, el recto o en los labios y la boca. También una madre infectada puede transmitir la sífilis al bebé antes de nacer.

¿Estás en riesgo de contraer sífilis?

Cualquier persona sexualmente activa puede contraer sífilis.

Debido a que las úlceras de la sífilis pueden encontrarse ocultas en la vagina, el ano, debajo del prepucio del pene o en la boca, no siempre es evidente que una pareja sexual tenga sífilis.

Cómo evitar contraer sífilis

- Mantener una relación mutuamente monógama con una pareja que se haya realizado la prueba de ITS y haya obtenido resultados negativos.
- Utilizar prácticas sexuales seguras
- Los condones pueden prevenir la transmisión de sífilis al evitar el contacto con una úlcera. Sin embargo, a veces las úlceras se producen en áreas no protegidas por un condón.

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

Los síntomas de la sífilis en adultos se pueden dividir en tres etapas:

Etapa primaria


Durante la primera etapa (primaria) de la sífilis, es posible que aparezca una sola úlcera, aunque también pueden encontrarse varias. Las úlceras permanecen de 3 a 6 semanas y se curan por más que no se reciba ningún tratamiento.

Etapa secundaria

Durante la etapa secundaria, pueden aparecer erupciones en la piel o úlceras en la boca, vagina o ano. La erupción puede tener un aspecto rugoso, de color rojo o manchas marrón rojizas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Los síntomas de esta etapa desaparecen por más que no se reciba ningún tratamiento.

Etapas latente y tardía

La etapa latente de la sífilis comienza cuando todos los síntomas anteriores desaparecen. Si no se recibe ningún tratamiento, la sífilis puede continuar en el cuerpo durante años sin evidenciar signos ni síntomas. En las últimas etapas de la sífilis, la enfermedad puede dañar los órganos internos y causar la muerte.



Treponema pallidum

¿Se puede curar la sífilis?

Sí, la sífilis se cura mediante un tratamiento adecuado con antibióticos indicado por el profesional médico. Sin embargo, este tratamiento no elimina los daños que ya ha causado la enfermedad.

¿Qué sucede si no se recibe el tratamiento de la sífilis?

Si no se recibe ningún tratamiento, la sífilis puede permanecer en el cuerpo durante años sin manifestar signos ni síntomas.